

薬事委員会における新規採用申請薬・中止薬・後発医薬品変更について  
令和7年3月4日 開催の薬事委員会において以下の薬品の審議を行いました。

(1)仮採用・限定採用申請品

薬品名	請求科	薬効・適応症など	申請枠(GE変更・中止薬剤)
ルブキネスカプセル7.9mg	腎臓内科	ループス腎炎	限定採用のためなし
フェスゴ配合皮下注IN	外科	○HER2陽性の乳癌 ○がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除 不能な進行・再発の結腸・直腸癌	限定採用のためなし
フェスゴ配合皮下注MA	外科	同上	限定採用のためなし

※ 次回の薬事委員会は <b>翌月第2火曜</b> を予定しています。(4月は変則的に第2火曜になります)	<b>2025年4月8日</b>
※ 薬事委員会にて新規採用された通常購入品は、 <b>委員会開催翌週水曜日より処方可能</b> となります。	<b>2025年3月12日</b>
※ 院内処方において、採用薬の切替は在庫調整をさせていただきますので、ご協力をお願いします。	

## (2)使用開始から一定期間が経過したものを審議しました。

採用種別	採用種別	薬品名	一般名	請求科	薬効・適応症	
限定採用	⇒	審議保留	エンタビオ皮下注108mgペン	リサンキズマブ (遺伝子組換え)	消化器内科	○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ○中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
限定採用	⇒	審議保留	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ (遺伝子組換え)	消化器内科	中等症から重症の活動期クローン病の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
限定採用	⇒	審議保留	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ (遺伝子組換え)	消化器内科	中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
限定採用	⇒	審議保留	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	皮膚科	原発性手掌多汗症
限定採用	⇒	中止	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)	血液内科	CD30陽性の下記疾患: ○ホジキンリンパ腫 ○末梢性T細胞リンパ腫 ○再発又は難治性の皮膚T細胞リンパ腫
院外限定採用	⇒	院外限定採用	ギャバロン錠5mg	バクロフェン	脳神経外科	下記疾患による痙性麻痺 脳血管障害、脳性(小児)麻痺、痙性脊髄麻痺、脊髄血管障害、頸部脊椎症、後縦靭帯骨化症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、その他の脳性疾患、その他のミエロパチー
仮採用	⇒	本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	脳神経外科	一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するペランパネル経口製剤の代替療法 ○てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) ○他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法
仮採用	⇒	本採用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	抑肝散加陳皮半夏	脳神経外科	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症
仮採用	⇒	審議保留	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	麻酔科	○抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与及び放射線照射に伴う消化器症状(悪心、嘔吐) ○術後の消化器症状(悪心、嘔吐)
仮採用	⇒	本採用	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	小児科	小児における肺炎球菌(血清型1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F及び33F)による侵襲性感染症の予防
本採用	⇒	中止	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	小児科	○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者における肺炎球菌(血清型1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F及び33F)による感染症の予防 ○小児における肺炎球菌(血清型1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F及び33F)による侵襲性感染症の予防
本採用	⇒	中止	クアトロバック皮下注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン	小児科	百日せき、ジフテリア、破傷風及び急性灰白髄炎の予防
本採用	⇒	中止	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	小児科	インフルエンザ菌b型による感染症の予防